

Astronomsko društvo Vega

Astronomski dogodki v letu 2013

Predstavitev za Repatice in komete

Gregor Vertačnik

Ljubljana, december 2012

Kazalo



- Uvod
- Vidnost notranjih planetov
- Vidnost Marsa, Jupitra in Saturna
- Navidezna srečanja nebesnih teles
- Kometi
- Meteorski roji

Uvod



- leta 2013 nobenega Sončevega in Luninega mrka, vidnega iz naših krajev
- majska trojna konjunkcija Merkurja, Venera in Jupitera
- ugodna Lunina mena za Perzeide
- dve lepi kometni predstavi?
- Sonce verjetno v (slabotnem) 11-letnjem višku aktivnosti, večja možnost polarnega sija

Vidnost notranjih planetov




- notranja planeta: Merkur in Venera
- vedno v bližini Sonca
- vidne vse mene, enako kot pri Luni
- največja možna kotna razdalja (odmik, elongacija) od Sonca odvisna od lege na tiru
- ob največjih odmikih planeta v prvem ali zadnjem krajcu
- precej ekscentrična in nagnjena orbita Merkurja pomemben dejavnik pri vidnosti planeta v večerni ali jutranji zarji

Venera in Merkur. Vira:
<http://image.gsfc.nasa.gov/poetry/venus/venus.html> in
<http://solarsystem.nasa.gov/planets/profile.cfm?Object=Mercury>






Grafična ponazoritev največjega navideznega odmika Venere in Merkurja od Sonca. Vir:
http://www.astronomy.virginia.edu/~mnc3z/images/astro121/morning_star.gif



Največja navidezna oddaljenost Venere (notranjega planeta) od Sonca je dolocena z razmerjem oddaljenosti :

$$\sin(\phi) = r_v / r_z$$

$$\phi = \arcsin(r_v / r_z)$$



Pogoj za naslednjo
isto lego:

$$\alpha = \beta + 360^\circ$$

$$\alpha = 360^\circ \cdot t / t_v$$

$$\beta = 360^\circ \cdot t / t_z$$

3. Keplerjev zakon :


$$t_0^2 \propto r^3 \Rightarrow t_z^2 = a \cdot r_z^3$$

$$\frac{t_v^2}{t_z^2} = \frac{r_v^3}{r_z^3} \Rightarrow t_v = t_z \sqrt{\left(\frac{r_v}{r_z}\right)^3}$$

$$\frac{t_s}{t_v} \cdot 360^\circ = \frac{t_s}{t_z} \cdot 360^\circ + 360^\circ$$

$$\frac{t_s}{t_v} = \frac{t_s}{t_z} + 1 \Rightarrow \frac{t_s}{t_v} - \frac{t_s}{t_z} = 1$$

$$t_s \left(\frac{1}{t_v} - \frac{1}{t_z} \right) = 1 \Rightarrow t_s = \frac{1}{\left(\frac{1}{t_v} - \frac{1}{t_z} \right)}$$



$$t_s = \frac{1}{\left(\frac{1}{t_z} \sqrt{\left(\frac{r_z}{r_v}\right)^3} - \frac{1}{t_z} \right)} = \frac{1}{\frac{1}{t_z} \left(\sqrt{\left(\frac{r_z}{r_v}\right)^3} - 1 \right)}$$


$$\Rightarrow t_s = \frac{t_z}{\sqrt{\left(\frac{r_z}{r_v}\right)^3} - 1}$$

Mejna primera (r_v za hipoteticni planet):

a) $r_v \rightarrow r_z \Rightarrow$ imenovalec proti nicli $\Rightarrow t_s$ proti neskoncnosti

b) $r_v \rightarrow 0 \Rightarrow$ imenovalec proti neskoncnosti $\Rightarrow t_s$ proti nicli

- Merkur v letu 2013:
 - najboljše jutranje lege:
 - ▶ 31. marec (28°)
 - ▶ 30. julij (20°)
 - ▶ 18. november (19°)
 - najboljše večerne lege:
 - ▶ 16. februar (18°)
 - ▶ 12. junij (24°)
 - ▶ 9. oktober (26°)



Shema različnih Merkurjevih men, gledanih z Zemlje.
Vir: <http://www.eso.org/public/outreach/eduoff/vt-2004/mt-2003/mt-mercury-orbit.html>



- Venera v letu 2013:
 - v januarju na jutranjem nebu, se začne izgubljati v svitu
 - v zgornji konjunkciji 28. marec, nevidna
 - od pozne pomladi na večernem nebu
 - 1. novembra 47° od Sonca




Venerine mene. Avtor: Statis Kalyvas - VT-2004 programme, vir: http://en.wikipedia.org/wiki/Phases_of_Venus

Vidnost Marsa, Jupitra in Saturna




- zunanji planeti ves čas skoraj v ščipu (polni meni)
- navidezna velikost se močno spreminja le pri Marsu
- Saturnov obroč navidezno spreminja nagib zaradi nagnjenosti Saturnove osi na ravnino kroženja





- Mars:
 - ne najbolj ugodno, v opoziciji 3. marca 2012 in 8. aprila 2014
 - na jutranjem nebu proti koncu leta
- Jupiter:
 - do aprila na večernem nebu, od avgusta na jutranjem
- Saturn:
 - sprva zjutraj, nato vso noč (opozicija s Soncem 28. aprila)
 - do septembra na večernem nebu, nato v bližini Sonca
 - precej "odprtji" obroči, naslednji maksimum je l. 2017



Saturn in njegove lune v noči s 27. na 28. april 2013. Vir: Stellarium

Navidezna srečanja nebesnih teles



- vsa zanimiva bližnja srečanja planetov v letu 2013 v bližini Sonca, pozno zjutraj ali zgodaj zvečer
- Merkur-Mars, 8. februar:
 - Kmalu po zaidu Sonca, zelo nizko nad zahodnim obzorjem



Merkur-Venera-Jupiter, 25.-28. maj, kmalu po zaidu Sonca na zahodnem nebu.
Vir: Stellarium



Merkur-Venera, 20. junij, kmalu po zaidu Sonca na zahodnem nebu. Vir: Stellarium



Mars-Jupiter, 22. julij, tik pred vzidom Sonca na vzhodnem nebu. Vir: Stellarium




Merkur-Saturn, 26. november, tik pred vzhodom Sonca na vzhodnem nebu. Vir:
Stellarium



Luna blizu Jupitra in Aldebarana, 22. januar zjutraj (na sliki) in 18. februarja
zvečer ter 17. marca zvečer. Vir: Stellarium



Spika 1° severno od Lune, 2. februar zjutraj in 25. april zjutraj; 18. junija zvečer $0,5^\circ$ stran (na sliki). Vir: Stellarium






Kometi

- odlični obeti, morda dva vidna s prostim očesom!
- 2011 L4 (PanSTARRS)
- 2012 S1 (ISON)
- povratni komet 2P/Encke

Komet 2011 L4 (PanSTARRS)



- odkrit junija 2011 z 1,8 m teleskopom sistema PanSTARRS za odkrivanje asteroidov, kometov in spremenljivih zvezd
- ob odkritju 20. magnitude in kar 7,9 a.e. proč od Sonca
- trenutno (pre)globoko na južnem nebu



Slika, na kateri je bil odkrit komet. Vir:
<http://www.space.com/11996-comet-earth-2013-flyby-c2011l4-pan-starrs.html>



- najbližje Zemlji 5. marca 2013 (1,1 a.e.), najsvetlejši nekaj dni kasneje
- po prisončju 10. marca (0,30 a.e.) pride na severno nebo, verjetno nekaj dni viden s prostim očesom
- hitro padanje sije od sredine marca, a aprila verjetno še vedno viden v daljnogledih
- nehvaležna napoved največja sija, ker gre verjetno za svež komet – slabo predvidljivo obnašanje
- morda bo nebesni spektakel, morda le dobra predstava za daljnoglede


Kometova tirnica je za 84° nagnjena glede na ekliptiko. Vir: JPL/NASA, <http://astrobob.areavoice.com/2012/05/28/panstarrs-the-next-bright-comet/>



Komet 2012 S1 (ISON)



- odkrit 21. septembra 2012 s 40 cm teleskopom mreže ISON v Kislovodsku (Rusija)
- slike sta posnela Vitalij Nevski in Artjom Novičonok
- že prvi teden komet "dvignil prah" v medijih, ker se bo močno približal Soncu



Odkritelja ob teleskopu, s katerim sta posnela prve slike kometa.
Foto: A. Novičonok, vir:
<http://cometography.com/lcomets/2012s1.html>

- v prisončju 28. novembra 2013, razdalja od središča Sonca 0,013 a.e.!
- tirnica spominja na Veliki komet leta 1680
- predvidoma do septembra 2013 viden le v večjih in kasneje tudi zmerno velikih teleskopih
- sredi novembra utegne postati viden s prostim očesom
- zadnje dni novembra in prve decembra blizu Sonca, morda viden podnevi od 28. do 30. novembra




Risba opazovanja Velikega kometa I. 1680 v Rotterdamu. Avtor: Lieve Verschueren, vir: <http://astrobob.areavoices.com/tag/c2011-l4-panstarrs/>



- v decembru vse višje na severnem nebu, morda še ves mesec viden s prostim očesom
- zaradi ugodne opazovalne geometrije utegne razviti izjemno dolg prašni rep!
- morda najbolj spektakularen komet za opazovalce s severne poloble po kometu Hale-Bopp l. 1997

Zelo podolgovata tirnica kometa ISON. Vir:
NASA/JPL,
http://en.wikipedia.org/wiki/C/2012_S1



Povratni komet 2P/Encke



- povratni komet z zelo kratko obhodno dobo 3,3 leta
- odkritelj Pierre Mechain I. 1786
- Johann Franz Encke šele I. 1819 izračunal tirnico
- razmeroma svetel komet, jedro veliko 5 km
- v prisončju naslednjič 21. novembra 2013
- s severne poloble najbolj viden oktobra in novembra, a dokaj blizu Sonca
- najsvetlejši v drugi polovici novembra, okrog 5. magnitude



Komet Encke posnet januarja 1994.
Vir:
<http://neo.jpl.nasa.gov/images/encke.html>



Meteorski roji

- zaželeno temno nebo, polna Luna zelo moti opazovanje!
- v letu 2013 najugodnejše za Perzeide
- Kvadrantidi (Volar, cirkumpolarno):
 - maksimum v noči 3. na 4. januar
 - ZHR \sim 120, srednje hitri utrinki
 - zadnji krajec bo motil opazovanja
- Liridi:
 - maksimum v noči z 22. na 23. april
 - ZHR \sim 18, srednje hitri utrinki
 - pred polno Luno, ugodno le pozno zjutraj




- Perzeidi:
 - 12. in 13. avgusta
 - ZHR \sim 100, hitri utrinki
 - prvi krajec, zelo ugodno
- Orionidi:
 - 21. oktobra
 - ZHR \sim 25, hitri utrinki
 - zadnji Lunin krajec (ne bo preveč moteč)



Shematski prikaz radianta – navidezne točke na nebu, odkoder prihajajo meteorji. Vir: http://en.wikipedia.org/wiki/Radiant_%28meteor_shower%29



- Leonidi:
 - maksimum 18. novembra zjutraj
 - ZHR 20+?, hitri utrinki
 - po ščipu (moteče)
- Geminidi:
 - maksimum 14. decembra
 - ZHR ~120, počasni utrinki
 - proti polni Luni, moteče



Radiant meteorskega roja Geminidov je v ozvezdju Dvojčka. Vir:
http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2000/ast08dec_1/



Viri in literatura

- Astronomski program Stellarium
- <http://eclipse.gsfc.nasa.gov/solar.html>
- http://www.seasky.org/astronomy/astronomy_calendar_2013.html
- <http://www.ast.cam.ac.uk/~jds/preds13.pdf>
- <http://www.imo.net/calendar/2011>
- <http://www.qppstudio.net/ephemeris/astronomical-2013-01.htm>
- <http://www.philharrington.net/planets.pdf>
- [http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_conjunctions_\(astronomy\)](http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_conjunctions_(astronomy))
- <http://caridgway.com/Astronomy/FutureTargets/2013.html>
- <http://w3c.ct.astro.it/calendario/almanacco/2013almaeng.html>
- <http://cometography.com/lcomets/2011l4.html>
- <http://mpcapp1.cfa.harvard.edu/cgi-bin/returnprepeh.cgi?d=c&o=CK11L040>
- <http://cometography.com/lcomets/2012s1.html>
- <http://mpcapp1.cfa.harvard.edu/cgi-bin/returnprepeh.cgi?d=c&o=CK12S010>
- <http://mpcapp1.cfa.harvard.edu/cgi-bin/returnprepeh.cgi?d=c&o=0002P>
- http://en.wikipedia.org/wiki/Comet_Encke
- <http://astrocometas.blogspot.de/2012/10/update-light-visual-curve-of-comet.html>
- <http://gloria.fzu.cz/en/news/Sledujeme-v%C3%BDvoj-aktivit-komety-Panstarrs>